

(1) Диагностировано ГТР

(2а) На каждом этапе учитывайте коморбидные состояния:

- бессонница
- расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ
- детородный потенциал; беременность
- пожилой возраст
- нейропатическая боль
- депрессия
- биполярная депрессия
- биполярная мания
- ПТСР

(2) Коморбидные состояния?

(3) Пациент принимал СИОЗС?

Нет

Да  
Нет ответа

(4) Пациент принимал другой СИОЗС или дулоксетин?

Нет

Да  
Нет ответа

(5) Пациент принимал СИОЗСин?

Нет

(3а) Назначьте СИОЗС или дулоксетин; возможные варианты:

- буспирон
- гидроксизин
- прегабалин
- бупропион

(4а) Назначьте другой СИОЗС или дулоксетин; возможные варианты:

- буспирон
  - гидроксизин
  - прегабалин
  - бупропион
  - бензодиазепин
  - венлафаксин
  - агомелатин
  - кава, родиола розовая, лавандовое масло
- Антисихотик второго поколения - не раньше третьего этапа лечения

Да  
Частичный ответ

(3б) Аугментация:

- гидроксизин
- прегабалин
- бензодиазепин

Антисихотик второго поколения - не раньше третьего этапа лечения

(5а) Назначьте СИОЗСин или что-нибудь из пункта (4а) или антисихотик второго поколения:

- кветиапин
  - рисперидон
- (не назначайте оланzapин)
- или вальпроевую кислоту