

(1) Диагностирована непсихотическая униполярная депрессия

(2) Пациент в стационаре с тяжелой меланхолической депрессией?

Да

(3) Показания к неотложной ЭСТ?

Нет

Да

(3a) Рекомендована ЭСТ. Если пациент отказывается или ЭСТ не дает результата, назначьте кетамин или переходите к следующему пункту алгоритма

Венлафаксин, миртазапин или ТЦА

(3b) Если нет ответа или ответ частичный, назначьте то, что еще не назначали (из набора венлафаксин, миртазапин или ТЦА), или добавьте литий или трийодтиронин

Нет

(4) Пациент принимал сертралин, эсциталопрам, бупропион?

Нет

(4b) Да, но ответа нет.
Выберите один из вариантов:
- Переход на другой препарат из пункта (4)
- Переход на венлафаксин или миртазапин
- Отмена препарата и проведение транскраниальной магнитной стимуляции
- Переход на S-аденозилметионин или зверобой
- Аугментация нутриентами (омега-3 жирные кислоты, L-метилфолат, N-ацетилцистеин) или светотерапия
- Аугментация кветиапином, рисперидоном или арипипразолом
- Аугментация бупропионом или миртазапином
- Аугментация литием или трийодтиронином

(4a) Сертралин, эсциталопрам, бупропион

Если нет улучшений, то у пациента резистентная депрессия